

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВИБУРКОЛ® (Viburcol®)

Регистрационный номер ЛП-№(000192)-(РГ-RU)

Торговое наименование препарата

Вибуркол®

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные для детей гомеопатические

Состав (на 1 суппозиторий):

Активные компоненты:

Chamomilla recutita (Хамомилла рекутита) D1 1,1 мг, Atropa bella-donna (Атропа белладонна) D2 1,1 мг, Solanum dulcamara (Солянум дулькамара) D4 1,1 мг, Plantago major (Плантаго майор) D3 1,1 мг, Pulsatilla pratensis (Пульсатилла пратенсис) D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemannii (Кальциум карбоникум Ганеманни) D8 4,4 мг;

Вспомогательное вещество: жир твердый* 1089,0 мг.

Масса суппозитория 1,1 г.

* смесь триглицеридов, диглицеридов и моноглицеридов растительного происхождения.

Описание

Суппозитории от белого до желтовато-белого цвета торпедообразной формы со слабым характерным запахом (без прогорклого запаха); на продольном срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у детей, а также для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных зубов.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не применимо. Лекарственный препарат Вибуркол® применяется только у детей.

Способ применения и дозы

Ректально. При острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных симптомах прорезывания молочных зубов детям до 6-ти месяцев по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; детям от 6 месяцев при температуре тела свыше 37,5 °С по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела свыше 38 °С по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки. При нормализации температуры тела по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки еще 3-4 дня.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В очень редких случаях (менее 1 случая на 10000 применений) возможно развитие умеренной диареи. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Беречь от перегрева и прямого солнечного света.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами, механизмами

Не применимо. Лекарственный препарат применяется только у детей.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные для детей гомеопатические. По 6 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной / полиэтиленовой пленки. 12 суппозитория (2 контурные ячейковые упаковки) вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3

Телефон: (495) 937-78-25

E-mail: info@heel-russia.ru