

Инструкция
по медицинскому применению препарата
СПИГЕЛОН®
(Spigelon®)

Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрационный номер и дата П N013499/01 от 27.02.2008

Торговое название:
Спигелон®

Лекарственная форма
Таблетки подъязычные гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку):

Активные компоненты: Spigelia anthelmia (Спигелия антельмия) D3 30 мг, Atropa belladonna (Атропа белла-донна) D3 30 мг, Bryonia (Бриония) D3 30 мг, Gelsemium sempervirens (Гельземиум семпервиренс) D3 30 мг, Melilotus officinalis (Мелилотус официналис) D3 30 мг, Natrium carbonicum (Натриум карбоникум) D3 30 мг, Acidum silicicum (Ацидум силицикум) D12 60 мг, Thuja occidentalis (Туя окциденталис) D12 60 мг;

Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми, коричневатыми или сероватыми вкраплениями, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатическое средство.

Показания к применению

Препарат применяется при головной боли различного генеза (мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и лактации

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения определяется врачом.

Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств.

Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки подъязычные гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru