

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

РЕНЕЛЬ®
(Reneel®)

Регистрационный номер

ЛП-№(000520)-(РГ-RU)

Торговое наименование Ренель®

Лекарственная форма

Таблетки подъязычные гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку):

Активные компоненты: Aluminium oxydatum (Алюминиум оксидатум) D12 75 мг, Berberis vulgaris (Берберис вульгарис) D2 15 мг, Acidum nitricum (Ацидум нитрикум) D4 30 мг, Lytta vesicatoria (Литта везикатория) D5 30 мг, Plumbum aceticum (Плюмбум ацетикум) D6 30 мг, Chondodendron (Хондодендрон) D3 30 мг, Serenoa repens (Сереноа репенс) D2 30 мг, Causticum Hahnemanni (Каустикум Ганеманни) D4 60 мг;

Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми, коричневатыми или сероватыми вкраплениями, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Препарат применяется у взрослых и детей старше 12 лет при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, мочекаменной болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных), непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозно-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или спустя 1 час после приема пищи. В острых случаях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут в течение не более двух часов.

Длительность курса лечения определяется лечащим врачом.

Применение препарата у детей старше 12 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не следует назначать пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией. Применение препарата у детей старше 12 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Указание для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в одной таблетке соответствует 0,025 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки подъязычные гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru