

Остеохель С

Osteoheels

Регистрационный номер

ЛП-№(001567)-(PG-RU)

Торговое наименование:

Остеохель С

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав (на 1 таблетку):

Активные компоненты: Hekla-Lava (Гекла-Лавы) D6 30 мг, Kalium iodatum (Калиум иодатум) D4 30 мг, Asa foetida (Аза фетида) D4 30 мг, Stillingia sylvatica (Стиллингия сильватика) D4 30 мг, Araneus diadematus (Аранеус диадематыс) D6 30 мг, Natrium sulfuricum (Натриум сульфурикум) D4 30 мг, Hydrargyrum oxydatum rubrum (Гидраргирум оксидатум рубрум) D9 60 мг, Calcium phosphoricum (Кальциум фосфорикум) D6 60 мг;

Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 301,5 мг.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желто-белого цвета. Без запаха или со слабым «чесночным» запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных заболеваний костной ткани и надкостницы. Препарат показан к применению у взрослых пациентов.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

С осторожностью

Заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая доза препарата у взрослых по 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Длительность курса лечения устанавливается лечащим врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Редко - повышенное слюноотделение.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Назначение гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания:

При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов также следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Если симптомы не исчезают или обостряются, необходимо обратиться к врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 ХЕ.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не следует назначать пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

-Heel

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Наименование и адрес держателя регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info_russia@heel.com