

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Nux vomica-Номассорд
Нукс Вомика-Гомаккорд

Регистрационное удостоверение ЛП-№(000513)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Нукс Вомика-Гомаккорд

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь гомеопатические.

Состав (на 100 г препарата):

Активные компоненты: Strychnos nux-vomica (Стрихнос нукс-вомика) D2 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Стрихнос нукс-вомика) D10 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Стрихнос нукс-вомика) D15 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Стрихнос нукс-вомика) D30 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Стрихнос нукс-вомика) D200 0,2 г, Strychnos nux-vomica (Стрихнос нукс-вомика) D1000 0,2 г, Bryonia (Бриония) D2 0,2 г, Bryonia (Бриония) D6 0,2 г, Bryonia (Бриония) D10 0,2 г, Bryonia (Бриония) D15 0,2 г, Bryonia (Бриония) D30 0,2 г; Bryonia (Бриония) D200 0,2 г; Bryonia (Бриония) D1000 0,2 г; Lycoperidium clavatum (Ликоподиум клаватум) D3 0,3 г; Lycoperidium clavatum (Ликоподиум клаватум) D10 0,3 г; Lycoperidium clavatum (Ликоподиум клаватум) D30 0,3 г; Lycoperidium clavatum (Ликоподиум клаватум) D200 0,3 г; Lycoperidium clavatum (Ликоподиум клаватум) D1000 0,3 г; Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D3 0,3 г; Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D10 0,3 г; Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D30 0,3 г; Citrullus colocynthis (Цитрюллюс колоцинтис) D200 0,3 г; *Вспомогательные вещества:* Этанол (Спирт этиловый) 96 % (об.) 27,8 г; Вода очищенная 66,9 г.

Содержание этанола в препарате около 35 % (по объему).

Фармакотерапевтическая группа:

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Описание:

Прозрачная бесцветная жидкость с запахом этанола.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии при спастических колитах.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе Состав.
- Возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность лечения составляет в среднем 2-5 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

В составе препарата содержится 35 объемных % этилового спирта.

Содержание этилового спирта в разовой дозе препарата (0,5 мл) составляет 0,138 г, что эквивалентно 2 мг/кг. Количество этилового спирта в каждой отдельной дозе эквивалентно менее 4 мл пива или 1 мл вина. Максимальная суточная доза (4,5 мл) содержит 1,243 г этилового спирта, что эквивалентно 18 мг/кг в сутки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы коричневого стекла (соответствует гидролитическому классу III) со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.01.2022 № 664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Срок годности: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25

E-mail: info_russia@heel.com