

Эскулюс комполитум

Aesculus compositum

Регистрационный номер: ЛП-№(001363)-(PF-RU)

Торговое наименование: Эскулюс комполитум

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь гомеопатические.

Состав (на 100 г препарата):

Активные компоненты: Aesculus hippocastanum (Эскулюс гипокастанум) D1 10 г, Secale cornutum (Секале корнутум) D3 1 г, Viscum album (Вискум альбум) D2 1 г, Nicotiana tabacum (Никотиана табакум) D10 1 г, Solanum nigrum (Солянум нигрум) D6 1 г, Arnica montana (Арника монтана) D3 1 г, Echinacea (Эхинацея) D2 1 г, Baptisia tinctoria (Баптизия тинктория) D4 1 г, Rhus toxicodendron (Рус токсикодендрон) D4 1 г, Cuprum metallicum (Купрум металликум) D13 1 г, Ruta graveolens (Рута гравеоленс) D4 1 г, Solanum dulcamara (Солянум дулькамара) D4 1 г, Colchicum autumnale (Колхикум отумнале) D4 1 г, Barium jodatum (Барииум йодатум) D6 1 г, Hamamelis virginiana (Гамамелис виргиниана) D4 1 г, Apis mellifica (Апис меллифика) D4 1 г, Acidum benzoicum e resina (Ацидум бензоикум и резина) D4 1 г, Eupatorium cannabinum (Эупаториум каннабинум) D3 1 г, Arteria suis (Артерия суис) D10 1 г, Natrium pyruvicum (Натриум пирувикум) D8 1 г;

Вспомогательные вещества: этиловый спирт (этанол) 96 % (об.), вода очищенная. Содержание этанола в препарате около 35 % (по объему).

Описание

Прозрачная или опалесцирующая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, артериосклероз, варикозное расширение вен).

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность к Rhus toxicodendron (Сумах ядовитый), Arnica (Арника), Echinacea (Эхинацея) или иным растениям семейства сложноцветных. Прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, коллагеноз, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания); СПИД, ВИЧ-инфекция, иммуносупрессия (в том числе цитостатическая противоопухолевая терапия; трансплантация органов или костного мозга в анамнезе); заболевания крови (агранулоцитоз, лейкопения); беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания в связи с недостаточностью клинических данных.

Способ применения и дозы: Препарат принимают внутрь по 10 капель, предварительно разведенных в 30 мл воды, 3 раза в день за 30 мин до еды или через 1 час после еды. При обострении заболевания принимают по 10 капель каждые 15 минут (в течение 2 часов). Курс лечения до 5 недель. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом.

Применение препарата более 8 недель возможно после консультации врача.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания: В состав препарата входит йодсодержащий компонент. При заболеваниях щитовидной железы повышенной чувствительностью к йоду не следует применять «Эскулюс композитум» без предварительной консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. Препарат содержит около 35 % этанола (по объему). В максимальной разовой дозе препарата (10 капель) содержится 0,138 г абсолютного спирта этилового (этанола), в максимальной суточной дозе (90 капель) содержится 1,242 г абсолютного спирта этилового (этанола). При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 10 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска: Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден,
Германия

Владелец регистрационного удостоверения:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ
Др.-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден,
Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru