

Люффель® Аллерго

таблетки для рассасывания гомеопатические

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается после 7 дней лечения, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что представляет собой препарат Люффель® Аллерго, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Люффель® Аллерго.
3. Прием препарата Люффель® Аллерго.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Люффель® Аллерго.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ ЛЮФФЕЛЬ® АЛЛЕРГО, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат Люффель® Аллерго это многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Лекарственный препарат Люффель® Аллерго применяется в качестве симптоматического средства у взрослых и детей от 3 месяцев до 18 лет для профилактики и облегчения симптомов аллергии, таких как: чихание, насморк, слезотечение, раздражение кожи.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ЛЮФФЕЛЬ® АЛЛЕРГО

Противопоказания

Не принимайте препарат Люффель® Аллерго:

- если у Вас аллергия на активные компоненты, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Люффель® Аллерго проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Проглатывание таблеток не вызывает никаких вредных последствий!

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.

При возникновении внезапных, тяжелых симптомов аллергии, например, затруднения дыхания или генерализованной кожной сыпи, следует обратиться к врачу, поскольку такие симптомы могут быть признаком заболеваний, требующих немедленного медицинского вмешательства. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,02 хлебной единицы (ХЕ).

Дети и подростки

Не давайте препарат Люффель® Аллерго детям в возрасте до 3 месяцев, так как безопасность и эффективность у детей в возрасте до 3 месяцев на данный момент не установлена. Применять препарат у детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет следует только после консультации с врачом.

Другие препараты и препарат Люффель® Аллерго

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

На сегодняшний день информация о взаимодействиях с другими лекарственными препаратами отсутствует. Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. В настоящее время данные по применению во время беременности и в период грудного вскармливания отсутствуют. В связи с этим, применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Люффель® Аллерго не оказывает влияния или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Люффель® Аллерго содержит лактозы моногидрат

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ЛЮФФЕЛЬ® АЛЛЕРГО

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Стандартная терапия (при хроническом течении заболевания, при слабо выраженных симптомах):

По 1 таблетке 3 раза в день.

Продолжительность лечения составляет от 4 до 6 недель; желательно начать лечение до начала сезона аллергии. По рекомендации лечащего врача возможно увеличение продолжительности лечения.

Начальная доза или доза при острых состояниях (при обострении, при выраженном проявлении симптомов):

По 1 таблетке каждые 0,5-1 час, но не более 12 таблеток в день, с последующим продолжением приема в стандартной дозе.

Профилактическое применение препарата

По 1 таблетке 3 раза в день. Рекомендуется начать лечение не менее чем за 4 недели до начала сезона аллергии.

Применение у детей и подростков

Безопасность и эффективность у детей в возрасте до 3 месяцев на данный момент не установлена. Данные отсутствуют.

Стандартная терапия (при хроническом течении заболевания, при слабо выраженных симптомах):

Детям от 3 месяцев до 2 лет: по 1 таблетке 1 раз в день.

Детям в возрасте 2-5 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день.

Детям в возрасте 6-11 лет: по 1 таблетке 2 раза в день.

Детям от 12 лет и старше: по 1 таблетке 3 раза в день.

Продолжительность лечения составляет от 4 до 6 недель; желательно начать лечение до начала сезона аллергии. По рекомендации лечащего врача возможно увеличение продолжительности лечения.

Начальная доза или доза при острых состояниях (при обострении, при выраженном проявлении симптомов):

Детям от 3 месяцев до 2 лет: по 1 таблетке каждые 1-2 часа, до 4 раз в день, с последующим продолжением приема в стандартной дозе.

Детям в возрасте 2-5 лет: по 1 таблетке каждые 1-2 часа, до 6 раз в день, с последующим продолжением приема в стандартной дозе.

Детям в возрасте 6-11 лет: по 1 таблетке каждые 1-2 часа, до 8 раз в день, с последующим продолжением приема в стандартной дозе.

Детям от 12 лет и старше: по 1 таблетке каждые 0,5-1 час до 12 раз в день, с последующим продолжением приема в стандартной дозе.

Профилактическое применение препарата

Детям от 3 месяцев до 2 лет: по 1 таблетке 1 раз в день.

Детям в возрасте 2-5 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день.

Детям в возрасте 6-11 лет: по 1 таблетке 2 раза в день.

Детям от 12 лет и старше: по 1 таблетке 3 раза в день.

Рекомендуется начать лечение не менее чем за 4 недели до начала сезона аллергии.

-Heel

Путь и (или) способ введения

Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. При применении у детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет следует растолочь таблетку и смешать полученный порошок с небольшим количеством воды. За 30 минут до и в течение 30 минут после приема таблетки рекомендуется воздержаться от любых действий, которые могут повлиять на активность препарата (например, прием пищи, питье, курение, чистка зубов или жевание жвачки).

Если Вы приняли препарата Люффель® Аллерго больше, чем следовало

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Если Вы или Ваш ребенок приняли препарат Люффель® Аллерго больше, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.

Если Вы забыли принять препарат Люффель® Аллерго

Если Вы забыли принять препарат Люффель® Аллерго вовремя, пропустите эту дозу и примите следующую в запланированное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Вместо этого дождитесь времени следующего приема препарата.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата Люффель® Аллерго возможны аллергические реакции.

При возникновении нежелательных реакций прием препарата следует прекратить.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Тел.: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30

Факс: +7 (495) 698-15-73

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Интернет-сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛЮФФЕЛЬ® АЛЛЕРГО

Храните препарат в недоступном для ребенка месте, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и пенале «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить 1 год после вскрытия пенала.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Люффель® Аллерго содержит:

Каждая таблетка содержит:

Acidum arsenicosum (Ацидум арсеникозум) D8	15,0 мг
Acidum formicicum (Ацидум формицикум) D8	15,0 мг
Acidum sulfuricum (Ацидум сульфурикум) D22	15,0 мг
Arctium (Арктиум) D8	15,0 мг
Arnica montana (Арника монтана) D6	15,0 мг
Graphites (Графитес) D10	15,0 мг
Histaminum dihydrochloricum (Гистаминум гидрохлорикум) D8	15,0 мг
Histaminum dihydrochloricum (Гистаминум гидрохлорикум) D12	15,0 мг
Histaminum dihydrochloricum (Гистаминум гидрохлорикум) D22	15,0 мг
Ledum palustre (Ледум палюстре) D8	15,0 мг
Lycopodium clavatum (Ликоподиум клаватум) D6	15,0 мг
Pix pinaceae (Пикс) D10	15,0 мг
Selenium (Селениум) D12	15,0 мг
Stibium sulfuratum nigrum (Стибиум сульфуратум нигрум) D10	15,0 мг
Strychnos ignatii (Стрихнос игнации) D6	15,0 мг
Sulfur (Сульфур) D12	15,0 мг
Tellurium metallicum (Теллуриум металликум) D10	15,0 мг
Thuja occidentalis (Туя окциденталис) D6	15,0 мг
Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат и магния стеарат.	

Внешний вид Люффель® Аллерго и содержимое упаковки

Таблетки для рассасывания гомеопатические.

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желто-белого цвета, без запаха.

По 50 или 100 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Тел.: +49 7221 501 00

Факс: +49 7221 501 210

Электронная почта: info@heel.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «Хеель Рус»

125040, Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Тел.: +7 (495) 937-78-25

Электронная почта: info@heel-russia.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

05/2024