

ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ® Н

Cerebrum compositum® N

Регистрационный номер ЛП-№(000457)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Церебрум композитум® Н

Лекарственная форма

Раствор для инъекций гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)):

Активные компоненты: Cerebrum suis (церебрум суис) D8 22 мкл, Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D10 22 мкл, Hepar suis (ренар суис) D10 22 мкл, Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D10 22 мкл, Kalium phosphoricum (калиум фосфорикум) D6 22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 мкл, Thuja occidentalis (туя окциденталис) D6 22 мкл, Strychnos ignatii (стрихнос игнатии) D8 22 мкл, Bothrops lanceolatus (ботропс ланцеолатус) D10 22 мкл, Acidum phosphoricum (ацидум фосфорикум) D10 22 мкл, Cinchona pubescens (цинхона пубесценс) D4 22 мкл, Sulfur (сульфур) D10 22 мкл, Kalium bichromicum (калиум бихромикум) D8 22 мкл, Gelsemium sempervirens (гельсемиум семпервиренс) D4 22 мкл, Ruta graveolens (рута гравеоленс) D4 22 мкл, Arnica montana (арника монтана) D28 22 мкл, Aesculus hippocastanum (эскулюс гиппокаштанум) D4 22 мкл, Manganum phosphoricum (манганум фосфорикум) D8 22 мкл, Magnesium phosphoricum (магнезиум фосфорикум) D10 22 мкл, Semecarpus anacardium (семякарпус анакардиум) D6 22 мкл, Conium maculatum (кониум макулятум) D4 22 мкл, Medorrhinum-Nosode (медорринум-Нозоде) D13 22 мкл, Hyoscyamus niger (гиосциамус нигер) D6 22 мкл, Aconitum napellus (аконитум напеллус) D6 22 мкл, Anamirta cocculus (анамирта коккулюс) D4 22 мкл, Ambra grisea (амбра гризея) D10 22 мкл;

Вспомогательные вещества: натрия хлорид q.s. для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Энцефалопатия различного генеза (расстройство памяти, внимания); стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе Состав.

- Известная гиперчувствительность к растениям семейства сложноцветных.

- Известная повышенная чувствительность к хинину.

- Дети до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.



Способ применения и дозы

Внутримышечно, внутривенно, подкожно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю. Курс лечения - 4-6 недель. Возможны повторные курсы лечения после согласования с лечащим врачом.

-Heel

Как вскрыть ампулу?

Обращаться с осторожностью. Внимательно следовать инструкции по открыванию.



Цветная точка должна находиться сверху!

Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.

Цветная точка должна находиться сверху!

После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в месте нанесения цветной точки.

Любое оставшееся содержимое следует выбросить.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, в том числе кожные аллергические реакции. При известной индивидуальной чувствительности к растениям семейства сложноцветных могут возникать реакции повышенной чувствительности (в том числе анафилактическая реакция). Временное появление красноты, припухлости и боли в месте инъекции. В очень редких случаях, после приема препаратов, содержащих хинин, могут наблюдаться кожные аллергические реакции или лихорадочные состояния (реакции гиперчувствительности). При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата следует сообщить об этом лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для инъекций гомеопатический. По 2.2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. На каждую пачку со 100 ампулами наклеивают прозрачную защитную этикетку, предохраняющую упаковку от открывания во время транспортировки.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмittle Хеель ГмБХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден,
Германия

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Биологише Хайльмittle Хеель ГмБХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден,
Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info_russia@heel.com