

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

САБАЛЬ-ГОМАККОРД (Sabal-Homaccord)

Регистрационный номер

Торговое наименование

Сабаль-Гомаккорд

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь гомеопатические

Состав (на 100 г препарата):

Активные компоненты: Serenoa repens (Sabal serrulatum) (сереноа репенс (сабаль серрулатум)) Ø 0,9 г, Serenoa repens (Sabal serrulatum) (сереноа репенс (сабаль серрулатум)) D10 0,3 г, Serenoa repens (Sabal serrulatum) (сереноа репенс (сабаль серрулатум)) D30 0,3 г, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D10 0,7 г, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D15 0,7 г, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D30 0,7 г, Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D200 0,7 г; *Вспомогательные вещества:* этанол (спирт этиловый) 96 % (объемных), вода очищенная.

Содержание этанола в препарате около 45 % (по объему).

Описание

Прозрачная жидкость светлого коричневатого-желтого цвета. Запах: слабо ароматический с характерным запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии дизурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I стадии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Возраст до 18 лет.

С осторожностью

С осторожностью следует принимать препарат при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме и заболеваниях головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Лекарственный препарат не предназначен к применению у женщин.

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждые 15 минут в течение 2 часов. Курс лечения 5 недель. Возможно повторение курса лечения после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании. При одновременном применении с варфарином возможно снижение свертываемости крови, что может потребовать коррекцию дозы варфарина.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней, а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

В случае ухудшения симптомов заболевания или появлении таких симптомов, как лихорадка, спазмы, следы крови в моче, боль при мочеиспускании или задержка мочи на фоне применения препарата, необходимо обратиться к врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,36 г абсолютного спирта этилового (этанола).

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,

Космодамианская набережная, 52, стр. 3

Телефон: (495) 937-78-25

E-mail: info@heel-russia.ru