



018100/5004 GP

RU

**Инструкция**  
по медицинскому применению препарата

# Sabal- Homaccord

## Сабаль- Гомаккорд

**Регистрационный номер** П N014678/01 от 06.05.2008

**Торговое название препарата**  
Сабаль-Гомаккорд

**Лекарственная форма**  
Капли для приема внутрь гомеопатические

**Состав** (на 100 г препарата): *Активные компоненты:* Serenoa repens (Sabal serrulatum) (сереноа репенс (сабаль серрулатум)) Ø 0,9 г; Serenoa repens (Sabal serrulatum) (сереноа репенс (сабаль серрулатум)) D10, D30 по 0,3 г; Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис (гепар сульфурис калькареум)) D10, D15, D30, D200 по 0,7 г; Этаноло около 45 объемных %.

**Описание:** Прозрачная жидкость светлого коричневатого-желтого цвета. Запах: слабо-ароматический с преобладанием запаха этанола.

**Фармакотерапевтическая группа:** Гомеопатическое средство.

**Фармакологическое действие:** Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Показания к применению:** В комплексной терапии дизурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I стадии.

**-Heel**

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
**С осторожностью:** заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

**Способ применения и дозы:** Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждые 15 минут в течение 2 часов. Курс лечения 5 недель. Возможно повторение курса лечения после консультации с врачом.

**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции.

**Передозировка:** Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания:** При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение двух недель, а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,36 г абсолютного спирта этилового (этанол).

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Не влияет.

#### **Форма выпуска**

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы коричневого стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышечкой из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

#### **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

#### **Эксклюзивный дистрибьютор в России/**

**организация, принимающая претензии потребителей**

ООО "Арнебия", 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28

Телефон: (495) 913-84-97