

018096/5004 GP

RU

**Инструкция**  
по медицинскому применению препарата

# Berberis- Homaccord

## Берберис- Гомаккорд

Гомеопатическое лекарственное средство

**Регистрационный номер** П N014700/01 от 08.07.2008

**Торговое название препарата:** Берберис-Гомаккорд

**Лекарственная форма:** Капли для приема внутрь гомеопатические.


**Состав** (на 100 г): *Активные компоненты:* Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис вульгарис (Берберис)) D2 0,4 г, Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис вульгарис (Берберис)) D10 0,4 г, Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис вульгарис (Берберис)) D30 0,4 г, Berberis vulgaris (Berberis) (Берберис вульгарис (Берберис)) D200 0,4 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс колоцинтис (Колоцинтис)) D2 0,3 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс колоцинтис (Колоцинтис)) D10 0,3 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс колоцинтис (Колоцинтис)) D30 0,3 г, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (Цитруллюс колоцинтис (Колоцинтис)) D200 0,3 г, Veratrum album (Veratrum album) D3 0,3 г, Veratrum album (Veratrum album) D10 0,3 г, Veratrum album (Veratrum album) D30 0,3 г, Veratrum album (Veratrum album) D200 0,3 г;

*Вспомогательные компоненты:* этанола около 35 % (объемных).


**Описание:** Прозрачная бесцветная или очень светлого желтовато-зеленого цвета жидкость с запахом этанола.

**Фармакотерапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

**-Heel**



**Показания к применению:** В комплексной терапии при спастических состояниях моче- и желчевыводящих путей на фоне воспалительных заболеваний (цистит, пиелостит, холецистит, холангит, желчно- и мочекаменная болезнь).



**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

**Применение при беременности и лактации:** В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

**Способ применения и дозы:** Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Продолжительность курса лечения определяется врачом.

**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

**Особые указания:** При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. Препарат содержит этиловый спирт около 35 % (объемных).

**Форма выпуска:** Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышечкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

**Условия хранения:** В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.  
**Хранить в недоступном для детей месте!**

**Срок годности:** 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

**Производитель:**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ  
Доктор-Рекеверг-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

**Эксклюзивный дистрибьютор в России:**

ООО "Арнебия", 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28  
Телефон: (495) 913-84-97

