



081057/5002 RU

Инструкция

по медицинскому применению препарата

Zeel^Т

Цель[®] Т

Регистрационный номер П N011685/03**Торговое название препарата:** Цель[®] Т**Лекарственная форма:** Раствор для внутримышечного введения гомеопатический

Состав (на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): *Активные компоненты:* Cartilago suis (картиляго суис) D6 2,2 мг, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D6 2,2 мг, Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D6 2,2 мг, Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D6 2,2 мг, Solanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D3 11,0 мг, Symphytum officinale (Symphytum) (симфитум официнале (симфитум)) D6 11,0 мг, Nadidum (надидум) D8 2,2 мг, Coenzym A (коэнзим А) D8 2,2 мг, Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинария канаденсис (сангвинария)) D4 3,3 мг, Natrium diethylxalacetikum (Natriumdiethylxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D8 2,2 мг, Acidum DL- α -lipoicum (Acidum alpha-lipoicum) (ацидум DL- α -липоникум (ацидум α -липоникум)) D8 2,2 мг, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (токсикодендрон кверцифолиум (рус токсикодендрон)) D2 11,0 мг, Arnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D4 220,0 мг, Sulfur (сульфур) D6 3,96 мг; *Вспомогательные компоненты:* натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.**Фармакотерапевтическая группа:** Гомеопатическое средство**Фармакологическое действие:** Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.**-Heel**

Показания к применению: В комплексной терапии артрозов различной этиологии, спондилоартрозов и плечелопаточных периартритов.


Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, особенно к токсикодендрону дуболистному и к растениям семейства астровых. Возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных.

С осторожностью: заболевания печени, при одновременном приеме гепатотоксичных веществ.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.


Способ применения и дозы: Если не назначено иначе, вводить внутримышечно по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) 2 раза в неделю. Доза, кратность приема и длительность курса лечения назначается врачом. Средний курс лечения составляет 4-5 недель. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Как вскрыть ампулу?



Цветная точка должна находиться сверху!

Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.



Цветная точка должна находиться сверху!

После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в месте нанесения цветной точки.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В случаях непереносимости токсикодендрона дуболистного (*Rhus toxicodendron*) и растения семейства астровых (например, арника) крайне редко может развиваться реакция, сопровождающаяся повышением температуры, покраснением, болью в месте введения инъекции. Для лекарственных средств и рецептур, содержащих сангвинарию, в литературе описаны единичные случаи повышения в крови активности «печеночных» ферментов (трансаминаз) и значений билирубина. В очень редких случаях желудочно-кишечные расстройства. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами: Не влияет.

Форма выпуска: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, D-76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru